

La lettura per ciascuna livello di assistenza

Regione	Punteggio complessivo prevenzione
LOMBARDIA	80,92
PIEMONTE	76,30
UMBRIA	73,90
TOSCANA	70,73
EMILIA ROMAGNA	70,27
PROV. AUTON. TRENTO	69,41
BASILICATA	68,71
MOLISE	68,08
SARDEGNA	65,51
LIGURIA	65,34
ABRUZZO	65,29
LAZIO	65,24
VENETO	63,63
MARCHE	61,74
VALLE D'AOSTA	59,16
PUGLIA	55,68
FRIULI VENEZIA GIULIA	52,00
CALABRIA	51,39
CAMPANIA	50,21
PROV. AUTON. BOLZANO	49,57
SICILIA	48,48

Regione	Punteggio complessivo distrettuale
PROV. AUTON. TRENTO	88,49
LIGURIA	86,39
PIEMONTE	86,19
VENETO	84,41
EMILIA ROMAGNA	83,14
TOSCANA	80,50
SICILIA	73,08
FRIULI VENEZIA GIULIA	71,43
MARCHE	71,39
LOMBARDIA	69,12
UMBRIA	65,56
PUGLIA	58,75
ABRUZZO	57,12
LAZIO	56,32
CALABRIA	48,71
MOLISE	46,00
BASILICATA	41,41
VALLE D'AOSTA	39,07
PROV. AUTON. BOLZANO	36,24
SARDEGNA	35,48
CAMPANIA	29,05


Regione	Punteggio complessivo ospedaliera
PROV. AUTON. TRENTO	92,40
TOSCANA	89,13
EMILIA ROMAGNA	84,83
VENETO	82,71
FRIULI VENEZIA GIULIA	78,96
PIEMONTE	78,82
UMBRIA	77,86
LIGURIA	74,50
SICILIA	72,39
PROV. AUTON. BOLZANO	70,37
LOMBARDIA	69,12
BASILICATA	68,40
LAZIO	66,16
MARCHE	64,81
VALLE D'AOSTA	60,21
ABRUZZO	59,75
PUGLIA	59,27
SARDEGNA	55,75
CALABRIA	53,35
MOLISE	33,38
CAMPANIA	25,41

> 80 %
70-80 %
60-70 %
50-60 %
40-50 %
< 40 %



La visione d'insieme sul monitoraggio dei Lea

Regione	Prevenzione	Distrettuale	Ospedaliera
PIEMONTE	76,30	86,19	78,82
VALLE D'AOSTA	59,16	39,07	60,21
LOMBARDIA	80,92	69,12	69,12
PROV. AUTON. BOLZANO	49,57	36,24	70,37
PROV. AUTON. TRENTO	69,41	88,49	92,40
VENETO	63,63	84,41	82,71
FRIULI VENEZIA GIULIA	52,00	71,43	78,96
LIGURIA	65,34	86,39	74,50
EMILIA ROMAGNA	70,27	83,14	84,83
TOSCANA	70,73	80,50	89,13
UMBRIA	73,90	65,56	77,86
MARCHE	61,74	71,39	64,81
LAZIO	65,24	56,32	66,16
ABRUZZO	65,29	57,12	59,75
MOLISE	68,08	46,00	33,38
CAMPANIA	50,21	29,05	25,41
PUGLIA	55,68	58,75	59,27
BASILICATA	68,71	41,41	68,40
CALABRIA	51,39	48,71	53,35
SICILIA	48,48	73,08	72,39
SARDEGNA	65,51	35,48	55,75



Regioni che garantiscono i Lea

	Prevenzione	Distrettuale	Ospedaliera
PIEMONTE	76,30	86,19	78,82
LOMBARDIA	80,92	69,12	69,12
PROV. AUTON. TRENTO	69,41	88,49	92,40
VENETO	63,63	84,41	82,71
LIGURIA	65,34	86,39	74,50
EMILIA ROMAGNA	70,27	83,14	84,83
TOSCANA	70,73	80,50	89,13
UMBRIA	73,90	65,56	77,86
MARCHE	61,74	71,39	64,81

> 80 %


70-80 %

60-70 %

50-60 %

40-50 %

< 40 %



Regioni che non garantiscono i Lea

	Prevenzione	Distrettuale	Ospedaliera
FRIULI VENEZIA GIULIA	52,00	71,43	78,96
LAZIO	65,24	56,32	66,16
ABRUZZO	65,29	57,12	59,75
PUGLIA	55,68	58,75	59,27
BASILICATA	68,71	41,41	68,40
CALABRIA	51,39	48,71	53,35
SICILIA	48,48	73,08	72,39
VALLE D'AOSTA	59,16	39,07	60,21
PROV. AUTON. BOLZANO	49,57	36,24	70,37
MOLISE	68,08	46,00	33,38
CAMPANIA	50,21	29,05	25,41
SARDEGNA	65,51	35,48	55,75

> 80 %
70-80 %
60-70 %
50-60 %
40-50 %
< 40 %



Sottoinsieme-test di indicatori

PREVENZIONE

(6 indicatori)

1	P01C	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)
2	P02C	Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)
3	P10Z	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, della alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino
4	P12Z	Copertura delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale
5	P14C	Indicatore composito sugli stili di vita
6	P15C	Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma organizzato, per cervice uterina, mammella, colon retto



ASSISTENZA DISTRETTUALE (8 indicatori)

1 a	D03C	Tasso di ospedalizzazione standardizzato in età adulta (≥ 18 anni) per: complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco Nel CORE ad anni alterni con l'indicatore D04C
1 b	D04C	Tasso di ospedalizzazione standardizzato in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite Nel CORE ad anni alterni con l'indicatore D03C
2	D09Z	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso
3	D10Z	Percentuale di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al totale di prestazioni di classe B.
4	D14C	Consumo di farmaci sentinella/traccianti per 1.000 abitanti. Antibiotici
5	D22Z	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA 1, CIA 2, CIA 3)
6	D27C	Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria.
7	D30Z	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore
8	D33Z	Numero di anziani (età ≥ 75) non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale R1, R2, R3 (intensità di cura) in rapporto alla popolazione residente.

Sottoinsieme-test di indicatori

ASSISTENZA OSPEDALIERA (7 indicatori)

1	H01Z	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) standardizzato in rapporto alla popolazione residente.
2	H02Z	Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 150 (10% tolleranza) interventi annui.
3	H04Z	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza (alleg. B Patto per la Salute 2010-2012) e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza in regime ordinario.
4	H05Z	Proporzione di colecistectomie laparoscopiche con degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni.
5	H13C	Percentuale di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giorni in regime ordinario.
6	H17C	Percentuale parti cesarei primari in maternità di I livello o comunque con <1.000 parti
7	H18C	Percentuale parti cesarei primari in maternità di II livello o comunque con ≥ 1.000 parti.

